

การนับ stat dose กับเวลามาตรฐานการให้ยา เพื่อเริ่ม dose ที่ 2

Interval of drug	เวลาในการให้ยา																							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5
q 2 hr	■																							
q 4 hr			3	8																				
q 6 hr			2	6	5																			
q 8 hr			2		5																			
Phenytoin q 8 hr	เริ่มยา Dose 2 ได้	อย่างเร็ว 24 ชั่วโมง หลัง Loading dose																						
Aminoglycoside q 8 hr	เริ่มยา Dose 2 ได้	อย่างเร็ว 6 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยา stat dose																						
q 12 hr			1		3																			
Vancomycin q 12 hr	เริ่มยา Dose 2 ได้	อย่างเร็ว 9 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยา stat dose																						
q 24 hr																								
Amphotericin B q 24 hr	เริ่มยา Dose 2 ได้	อย่างเร็ว 14 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยา stat dose																						
Phenytoin q 24 hr	เริ่มยา Dose 2 ได้	อย่างเร็ว 24 ชั่วโมง หลัง Loading dose																						
Aminoglycoside q 24 hr	เริ่มยา Dose 2 ได้	อย่างเร็ว 10 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยา stat dose																						

▼ เวลาติด

■ คือ เวลามาตรฐานการให้ยา

→ ร่วงเข้าหาเวลาใด ให้นับ Dose stat เป็นเวลานั้นๆ

#### ใช้หลักการถ้าให้ยาในช่วง 2/3 ของ interval นับเวลาให้ยาเป็นเมื่อเวลาก่อนหน้า ถ้าให้ยาหลัง 2/3 ของ interval นับเวลาให้ยาเป็นเมื่อเวลาถัดไป  
 #### และคำนึงถึงระดับยาคู่สุดท้ายก่อนให้ยามื้อที่ 2 ของยาบางตัว เพื่อป้องกันพิษจากยาที่สะสมมากเกินไป ก่อนเริ่มให้ยามื้อที่ 2  
 #### ตัวเลขบนลูกศร คือ จำนวนยาที่ต้องจ่าย นับถึงเวลา 14.00 น. ของวันถัดไป (รวม Stat dose)

\*\*Phenytoin ในเด็ก 0-15 ปี ให้ dose ที่ 2 ตั้งแต่ 4 hr. เป็นต้นไป (เพื่อให้ยาได้ระดับ)