แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก(แบ่งตามระยะการเกิดโรค) โรงพยาบาลกุมภวาปี

กิจกรรมการพยาบาล															
	ด	ช	บ	ด	ช	บ	ด	ช	บ	ด	ช	บ	ด	ช	บ
1.ระยะไข้ (2-7 วัน) ไข้ Day.....															
(ไข้/ไข้สูงเฉียบพลัน ,ปวดศรีษะ ,ปวดกระบอกตา,ปวดกล้ามเนื้อ,ปวดกระดูกและข้อ,ผื่นแดง ,อาการเลือดออก เช่น TT +VE,เลือดกำเดาไหล)															
1.วัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง															
2.BT ≥ 38 °C เช็ดตัวลดไข้															
3.BT ≥ 39 °C ให้ยาลดไข้Paracetamol 10 มก./กก./ครั้ง ทุก 4-6 ชั่วโมง															
4.ให้อาหารอ่อน / ORS / นม / น้ำผลไม้ <u>งดรับประทาน</u> อาหารหรือน้ำที่มีสีแดง สีน้ำตาลหรือสีดำ , งดให้ NSAIDS															
5.Bleeding Precaution ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ															
6. ทำ I/O ทุก 8 ชั่วโมง															
7.ตรวจUrine Spgr. ทุก 8 ชั่วโมง															
8.ส่งLAB ; CBC ,Plt.															
9.ใช้เครื่อง Infusoin Pump เมื่อมีการให้สารน้ำ															
10.ให้คำแนะนำ / ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ															
2.ระยะวิกฤติ /ช๊อค (24-48 ชั่วโมง)															
(ไข้ลด/อาการแย่ลง ,Hct ↑จากBase line 10-20% ,Plt.↓<100,000, BP↓Pulseเบาเร็ว,Pulse Pressure แคบ(<20mmHg) , ปัสสาวะออกน้อย)															
1.จัดให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้เคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด															
2.วัดสัญญาณชีพ ทุก 1-2 ชั่วโมง (ผู้ป่วยช๊อควัดทุก5-15นาที)															
3.ให้ O2 นอนศรีษะต่ำ แก่ผู้ป่วยช๊อค หรือกระสับกระส่าย หอบ มีอาการทางสมอง															
4.IV Fluid : ตามCPG / ใช้เครื่อง Infusoin Pump ในการให้สารน้ำ															
5.Serial Hct. ทุก 4-6 ชม. (ถ้ามีเลือดออก ทุก1-2 ชม.)															
6.Bleeding Precaution และ Observe bleeding จากอวัยวะต่างๆ															
7. ทำ I/O ทุก 8 ชั่วโมง หรือ ตามอาการ															
8.ห้ามการทำหัตถการที่อาจทำให้เลือดออก เช่น การใสNG ,Gastric lavage															
9.ให้คำแนะนำ/ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ															
3.ระยะฟื้นตัว(A :Appetite, B:Bradycardia ,C:Convalescent,D:Diuresis)															
(ไข้ลง อาการโดยทั่วไปดีขึ้น รับประทาอาหารได้,Hct.ลดลงสู่ปกติ, V/S stable, ปัสสาวะออกดี ,คันตามฝ่ามือฝ่าเท้า)															
1.วัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง															
2.Off IV Fluid															
3.แนะนำBleeding Precaution อย่างน้อย 2 สัปดาห์															
4.แนะนำรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย ผลไม้ น้ำผลไม้															
5.แนะนำระวังการเกิดอุบัติเหตุ หกล้ม ศีรษะกระแทกพื้น ไม่เล่นโลดโผน															
4.การควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก															
1.โทรแจ้งงานควบคุมโรค ตามมาตรการ 3 3 1															
2.แนะนำญาติในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาโอง															
สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย **ลงชื่อ จนท .ผู้บันทึก**															