

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง	อาการที่เฝ้าระวัง	สัญญาณเตือนที่เฝ้าระวัง	แนวทางการป้องกัน
CHLOROQUIN/ Hydroxychloroquine	Maculopathy	วัด VA abnormal แยกแสงสีเหลืองไม่ออก	ตรวจตา ปีละ 1 ครั้ง ในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้
Tenofovir	Fanconi syndrome	ค่า cr สูง รวมกับมีelectrolyte imbalance	ติดตามค่าการทำงานของไตและน้ำตาล F/U 2 wk หลังเริ่มยา และติดตามค่า lab cr,GFR,urine,e-lyte ทุก 6 เดือน
simvastatin	Rhabdomyolysis	ปวดกล้ามเนื้อผิดปกติ	
Metformin	Lactic acidosis	electrolyte imbalance	มี pop alert เตือนเฝ้าระวังการใช้ยา Metformin ในคนไข้ที่มี eGFR < 30 ml/min
Warfarin	bleeding	INR > 5 , มีจ้ำเลือดมึนปัสสาวะเป็นเลือด	มีการติดตามค่า INR ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล
zidovudine	Anemia	เหนื่อย เพลีย	ติดตามผลเลือด CBC ทุก 6 เดือน
pyrazinamide/ rifampicin		ตาเหลือง ตัวเหลือง อาเจียนเยอะ	ตรวจติดตาม liver function test ผู้ป่วยที่ใช้ยา rifampicin และ PZA ที่ 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน
amlodipine/phenytoin	gingival hypertrophy		พบทันตแพทย์ตรวจช่องปาก ปีละ 1 ครั้ง ในผู้ป่วยที่ใช้ยา amlodipine/phenytoin
amlodipine/ manidipine/pioglitazole	peripheral edema		มีข้อมูลการเฝ้าระวังสังเกตอาการบวมหลังรับประทานยา amlodipine/manidipine ที่ฉลากยาของผู้ป่วย
enalapril	Dry cough		มีข้อมูลการเฝ้าระวังสังเกตอาการไอแห้งๆหลังรับประทานยา Enalapril ที่ฉลากยา

			ของผู้ป่วย
--	--	--	------------