

Drug Use Evaluation

การประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมบนหอผู้ป่วย



รายการยาที่ประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation: DUE)

- Levofloxacin Injection
- Piperacillin/Tazobactam
- Meropenem
- Colistin
- Vancomycin
- Fosfomycin
- Ciprofloxacin Injection



การดำเนินงาน DUE ของโรงพยาบาลกุมภวาปี

Retrospective DUE เป็นการประเมินการใช้ยาย้อนหลังหลังจากผู้ป่วยหยุดใช้ยาแล้วสามารถช่วยวางแผนป้องกันการใช้ยาไม่เหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้

[illegible][illegible]

Bw (kg)	Loading dose Vancomycin inj		Maintenance dose	
	Dose (mg)	แวกานามัยซิน	Dose (mg)	แวกานามัยซิน
>110	-	-	1750	120 กรัม
90-110	3000	360 กรัม	1500	90 กรัม
75-89	2500	300 กรัม	1250	75 กรัม
60-74	2000	240 กรัม	1000	60 กรัม
50-59	1500	180 กรัม	750	60 กรัม
30-49	1000	120 กรัม	500	60 กรัม


แบบฟอร์มขอใช้ยา
controlled ATB

แนวทางพัฒนาการดำเนินงาน DUE ของโรงพยาบาลกุมภวาปี

Concurrent DUE เป็นการติดตามการใช้ยา
ระหว่างที่ผู้ป่วยใช้ยาหลังจากได้รับยาครั้งแรกไป
แล้วและยังมีการใช้อยู่ ช่วยให้สามารถแก้ปัญหา
ได้ทัน่วงที



ลดปริมาณการใช้ยา มูลค่ายา
และลดเชื้อดื้อยาได้



หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลกุมภวาปี