


**Strong recommendation สำคัญเพื่อผู้ป่วยปลอดภัย**  
**โรงพยาบาลกุมภวาปี**

ลำดับ	มาตรฐานสำคัญจำเป็น	Strong recommendation
1.	ผ้าตัดผิตคน / ผิตข้าง / ผิตตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ไม่ mark site ไม่รับ case</li> <li>▪ ไม่ time out ไม่ลงมีดผ้าตัด</li> </ul>
2.	อุปกรณ์ตกค้างในตัวผู้ป่วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ไม่ sign out ไม่เย็บปิด</li> </ul>
3.	ให้เลือดผิตคน/ผิตหมู่	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การรับเลือดครั้งแรกให้เจาะเลือดใส่ Hct. Tube ก่อนมารับเลือดทุกครั้งคนละเวลากับหลอด cross match ห้ามเจาะไว้ล่วงหน้า</li> <li>▪ การจ่ายเลือด ปฏิบัติตามแนวทางจ่ายเลือด ยิงบาร์โค้ดทั้ง 3 จุด</li> <li>▪ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดทุกครั้ง</li> </ul>
4.	แพ้ยาซ้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ไม่สั่งยาในระบบ HOSXP ไม่จ่ายยา (OPD case)</li> <li>▪ ยาด่วน ต้องมีประวัติแพ้ยาไม่มีประวัติ ไม่จ่ายยา</li> <li>▪ IPD เภสัชคัดลอกในระบบ HOSXP เท่านั้นจึงจ่ายยา</li> </ul>

ลำดับ	Disease/Symptom	Strong recommendation
1.	Abdominal pain	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ต้องตรวจ abdomens ถูกต้อง</li> <li>▪ RUQ ต้องทำ U/S, R/O condition Sx ก่อน admit</li> <li>▪ RLQ. ต้องทำ Alvarado score /PAS ก่อน admit</li> <li>▪ เด็กมาด้วย abdominal pain ก่อน admit ทำ PAS ทุกราย</li> </ul>
2.	Fracture around the Hip	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Film around the hip ต้อง consult film กับ staff orthopedic และ X-ray ทุกราย</li> <li>▪ เดินไม่ได้ ยังไม่ได้ confirm film admit</li> </ul>
3.	Fever	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เด็กอายุ &lt; 3 เดือนมาด้วยไข้ BT&gt;38 องศา ให้ consult Staff ทุกราย</li> </ul>
4.	Abnormal uterine bleeding	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ชักประวัติ LMP/PMP</li> <li>▪ UPT ทุกราย</li> <li>▪ PV ทุกราย</li> </ul>
5.	Pelvic pain	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ตรวจ Abdomen R/O surgical condition</li> <li>▪ PV ทุกราย (ที่เคยมีประวัติ SI)</li> <li>▪ UPT ,US ทุกราย</li> </ul>



(พญ.นุชรี มะลิซ้อน)

ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง

วันที่ 2 ธันวาคม 2567