

## ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์ยาที่มีความเสี่ยงสูง

ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug บริเวณป้ายชื่อยา



ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug บริเวณบรรจุภัณฑ์ยา



ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug บริเวณป้ายชื่อยา



ตัวอย่างสัญลักษณ์ High Alert Drug (#####) หลังชื่อยา  
 บนใบสั่งยา (ในตัวอย่างคือ Digoxin)

โรงพยาบาลกุมภวาปี      เบสงยา    ผู้ป่วยนอก    ต.เขตพม.รพ.บว.ภ.ว. 225  
 ลำดับที่รับยา 251

**HN 00006261**    วันที่ 28 มิถุนายน 2022    เวลา 08:03    เวลาพิมพ์ 18:38:00

ชื่อ นางบุญเกิด บุตรโยธี    อายุ 69 ปี 11 เดือน    CID 3-4104-00060-83-4

ที่อยู่ 43 หมู่ 03 ต.เชียงแห้ว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี    **BMI= 19.141**

สิทธิการรักษา ผู้สูงอายุ ในเขต    เลขที่สิทธิ ท7709454130

น้ำหนัก **49** กก.     ตั้งครรภ์     ให้นมบุตร    นัดอีก 59 วัน / วันที่นัด 26 สิงหาคม 2022

FBS    mg/dL     eGFR **40.09** ml/min     INR    **BP= 164 /74**

ยาที่แพ้ ปฏิเสธการแพ้ยา    **Pulse = 74**

Rx	ชื่อยา / วิธีรับประทาน	จำนวน	รวมราคา
1	ค่าบริการผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ:55021	1	50.00
2	Creatinine, blood:32202	1	40.00
3	PT (Prothombin Time):30201	1	75.00
4	Blood Urea Nitrogen (BUN):32201	1	40.00
5	Electrolyte (Na, K, Cl, CO2) (ชนิดละ 20 บาท):32001	1	100.00
6	DIGOXIN TAB##### 0.25 MG TAB T@+1 วัน ครั้ง เม็ดวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า	30	45.00
7	FOLIC ACID 5 mg TAB T1+1 วัน 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า	60	30.00
8	MANIDIPINE TAB++++ 20MG เม็ด T1+1 วัน 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า	60	233.00
9	furosemide (lasix) tab 40 mg TAB T1+1 วัน 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า	60	60.00
10	OMEprazole (Losec) 20 mg CAP T1-1 วัน 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง	60	90.00
11	ยาระบายมะขามแขก 500 MG เม็ด T2.1 วัน 2 เม็ดวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน	20	30.00
12	SPIRONOLACTONE 25 MG TAB T1+1 วัน 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า	60	90.00

\*\*ผู้ป่วยรับประทานยา warfarin- หลีกเลี่ยงการใช้ยา NSAIDs- หลีกเลี่ยงการนวด การฉีดยา IMหากต้องการทราบยาที่สั่ง

แพทย์ผู้สั่ง พญ.กนกวรรณ พลสรศักดิ์      รวมมูลค่า **883.00** บาท

การวินิจฉัย 1500      ผู้จ่าย

Heart failure      ผู้ตรวจสอบ

หน้า 1 / 2      ผู้จ่ายยา

ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug ใน Doctor's order  
 ที่มีคำสั่งใช้ยา High Alert Drug (ในตัวอย่างคือ oxytocin)

Date/Time	Order for Drug	1
AN: 530007805 HN: 0176688 อายุ: 33 ปี 7 ค. นาง โชษฐา โกศลอินทร์ (หญิง) พญ. เสาวณีย์ ตันมโนวิมลกุล (เด็กคลอดก่อนกำหนด)	<p><u>Post-op. ordn for VCS, etc</u></p> <p>1000 5-5 DM<sub>2</sub> 1,000 ml x III                      8 - 120 ml/hr</p> <p>- Add Synto 50mg @ 4 hr                      - Add Synto 50mg @ 8 hr                      - Add Synto 50mg @ 12 hr                      - Add Synto 50mg @ 16 hr                      - Add Synto 50mg @ 20 hr                      - Add Synto 50mg @ 24 hr                      - Add Synto 50mg @ 28 hr                      - Add Synto 50mg @ 32 hr                      - Add Synto 50mg @ 36 hr                      - Add Synto 50mg @ 40 hr                      - Add Synto 50mg @ 44 hr</p>	<p>MCS - 1000                      • bilateral body care</p> <p>he</p> <p>2000 1000 (1400)</p>
AN: 530007805 HN: 0176688 อายุ: 33 ปี 7 ค. นาง โชษฐา โกศลอินทร์ (หญิง) พญ. เสาวณีย์ ตันมโนวิมลกุล (เด็กคลอดก่อนกำหนด)	<p>1000 5-5 DM<sub>2</sub> 1,000 ml x III                      8 - 120 ml/hr</p> <p>- Add Synto 50mg @ 4 hr                      - Add Synto 50mg @ 8 hr                      - Add Synto 50mg @ 12 hr                      - Add Synto 50mg @ 16 hr                      - Add Synto 50mg @ 20 hr                      - Add Synto 50mg @ 24 hr                      - Add Synto 50mg @ 28 hr                      - Add Synto 50mg @ 32 hr                      - Add Synto 50mg @ 36 hr                      - Add Synto 50mg @ 40 hr                      - Add Synto 50mg @ 44 hr</p>	<p>1000 5-5 DM<sub>2</sub> 1,000 ml x III                      8 - 120 ml/hr</p> <p>- Add Synto 50mg @ 4 hr                      - Add Synto 50mg @ 8 hr                      - Add Synto 50mg @ 12 hr                      - Add Synto 50mg @ 16 hr                      - Add Synto 50mg @ 20 hr                      - Add Synto 50mg @ 24 hr                      - Add Synto 50mg @ 28 hr                      - Add Synto 50mg @ 32 hr                      - Add Synto 50mg @ 36 hr                      - Add Synto 50mg @ 40 hr                      - Add Synto 50mg @ 44 hr</p>
AN: 530007805 HN: 0176688 อายุ: 33 ปี 7 ค. นาง โชษฐา โกศลอินทร์ (หญิง) พญ. เสาวณีย์ ตันมโนวิมลกุล (เด็กคลอดก่อนกำหนด)	<p>1000 5-5 DM<sub>2</sub> 1,000 ml x III                      8 - 120 ml/hr</p> <p>- Add Synto 50mg @ 4 hr                      - Add Synto 50mg @ 8 hr                      - Add Synto 50mg @ 12 hr                      - Add Synto 50mg @ 16 hr                      - Add Synto 50mg @ 20 hr                      - Add Synto 50mg @ 24 hr                      - Add Synto 50mg @ 28 hr                      - Add Synto 50mg @ 32 hr                      - Add Synto 50mg @ 36 hr                      - Add Synto 50mg @ 40 hr                      - Add Synto 50mg @ 44 hr</p>	<p>1000 5-5 DM<sub>2</sub> 1,000 ml x III                      8 - 120 ml/hr</p> <p>- Add Synto 50mg @ 4 hr                      - Add Synto 50mg @ 8 hr                      - Add Synto 50mg @ 12 hr                      - Add Synto 50mg @ 16 hr                      - Add Synto 50mg @ 20 hr                      - Add Synto 50mg @ 24 hr                      - Add Synto 50mg @ 28 hr                      - Add Synto 50mg @ 32 hr                      - Add Synto 50mg @ 36 hr                      - Add Synto 50mg @ 40 hr                      - Add Synto 50mg @ 44 hr</p>

**High Alert Drug**

หมายเหตุ : กรุณาจะบุคลากร OFF โดยไม่ต้องเขียนไปยกเลิกคำสั่งเก่า

ตัวอย่างสัญลักษณ์ High Alert Drug (#####) หลังชื่อยาใน profile ผู้ป่วยใน  
ที่มีคำสั่งใช้ยา High Alert Drug

หน้า 1 / 1

**แบบบันทึกการใช้ยาผู้ป่วย (Drug Profile)**

โรงพยาบาลกุมภวาปี


ผู้รายงาน : ณัฐธิดา ขาญนรา

ชื่อ น.ส. เลียน เกษรักษา      HN 000254843      AN 650009645      เพศ หญิง      อายุ 54 ปี 5 เดือน      ตึก ตึก ICU Med      เตียง ICU07



ชื่อและขนาดยา	วิธีการใช้	วันเดือน													
		29/06	30/06	1/07	2/07	3/07	4/07	5/07	6/07	7/07	8/07	9/07	10/07	11/07	12/07
<b>ยา Continue</b>															
1 [C] VITAMIN B1 100 MG/ML Ampoule (1 ml)	200 mg IV q 8 hr					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2 [C] Meropenem Inj.++++ 1 G/VIAL VIAL	1 g IV drip q 8 hr					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3 [C] NSS 0.9% 100ml BAG	Drip+Drug					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4 [C] PANTOPRAZOLE++++ 40 mg Vial	Pantoprazole IV 8 mg/hr (											10			
5 [C] NSS 0.5% 100ml BAG	+Drug										5				
<b>ยา STAT</b>															
6 [1] NOREPINEPHRINE BITARTRATE#### 1	1:10 IV 13 mcg/min 8 mg											8			
7 [1] D5-W INJ 5% - BOTT	Drip+Drug											4			
8 [1] NSS 0.9% 100ml BAG	IV 50 cc/hr											2			
9 [1] KCL#### 20mEq/10ml AMP	40 mEq add IV ( 40 mEq											1			
10 [1] D5-S2 INJ 1000 ML 1000ML	IV 20 cc/hr											1			
11 [1] (สั่งเป็น ซีซี) KCL ELDEX 15ml	30 cc stat											30			
12 [1] REGULAR INSULIN ####(สั่งเป็น UNIT) 100	>10 unit add IV -											20			
13 [1] STERILE WATER FOR INJ 100ml - ml. bo												10			
14 [1] NSS 0.9% 100ml BAG												10			
15 [1] /Suction tube #14%%%%												10			
16 [1] /Suction tube #10%%%%												10			
17 [1] /Terumo 9%												3			
18 [1] /IVSet												3			
19 [1] KCL#### 20mEq/10ml AMP	40 mEq add IV ( 40 mEq											2			
20 [1] NSS 0.9% 1000ML BAG	IV 50 cc/hr											1			
21 [1] PANTOPRAZOLE++++ 40 mg Vial	80 mg IV stat											2			
22 [1] NSS 0.9% 100ml BAG	Drip+Drug											2			



ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug หน้า chart  
ผู้ป่วยที่มีคำสั่งใช้ยา High Alert Drug




ตัวอย่างการประทับตรา High Alert Drug บนซองยาความเสี่ยงสูงสำหรับจ่ายให้ ward  
พร้อม ฉลากช่วยการให้ยา





ตัวอย่างการประทับตรา High Alert Drug บนซองยาความเสี่ยงสูงสำหรับจ่ายให้ผู้ป่วยนอก  
พร้อม ฉลากช่วยการให้ยา



ตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์ High Alert Drug และรายละเอียดบนขวดสารน้ำที่ผสมยาความเสี่ยงสูง

